

Inhalation mit Dosieraerosol via Vorschaltkammer mit Maske

1. Die Inhalation mit einem Dosieraerosol soll immer mit einer kleinvolumigen Vorschaltkammer erfolgen.
2. Bei Kleinkindern bis 3 Jahren wird die Inhalation mit Dosieraerosol via Vorschaltkammer und Maske durchgeführt
3. Das DA soll 5x kräftig auf und ab geschüttelt werden und nach Entfernen des Deckels fest in die Vorschaltkammer gesteckt werden.
4. Halte die Maske mit waagrecht Vorschaltkammer dicht ans Gesicht des aufrecht stehenden oder sitzenden Kindes und drücke das Dosieraerosol 1x kräftig nach unten. Es soll die kleinstmögliche Maske verwendet werden, die zur vollständigen Bedeckung von Mund und Nase führt.
5. Das Kind soll nun 10 ruhige Atemzüge ausführen.
6. Wenn ein weiterer Hub nötig ist, das Dosieraerosol vor erneuter Betätigung wieder 5x kräftig schütteln.
7. Falls ein kortisonhaltiges Dosieraerosol verwendet wird, verhindert das nachträgliche Mundspülen, Trinken oder Zähneputzen Rückstände im Mund. Bei Anwendung mit Maske, verhindert das Abwischen des Gesichts mit einem feuchten Lappen Rückstände im Gesicht.
8. Bei täglicher Anwendung von kortisonhaltigen Präparaten ist es hilfreich, dieses zur Erinnerung bei der Zahnbürste aufzubewahren.