

Inhalation mit Dosieraerosol via Vorschaltkammer ohne Maske

1. Die Inhalation mit einem Dosieraerosol soll immer mit einer kleinvolumigen Vorschaltkammer erfolgen.
2. Bei Kindern ab 3 Jahren wird die Inhalation mit Dosieraerosol via Vorschaltkammer ohne Maske durchgeführt
3. Das DA soll 5x kräftig auf und ab geschüttelt werden und nach Entfernen des Deckels fest in die Vorschaltkammer gesteckt werden.
4. Das Kind soll das Mundstück zwischen die Zähne halten und mit den Lippen dicht umschliessen. Damit die Inhalation nur durch den Mund erfolgt, kann die Nase zugehalten werden. Bei waagrecht gehaltener Vorschaltkammer betätige 1x kräftig das Dosieraerosol.
5. Das Kind soll einmal tief Einatmen und während 10 Sekunden den Atem anhalten. Falls dies nicht möglich ist während 10 Atemzügen ruhig ein- und ausatmen.
6. Wenn ein weiterer Hub nötig ist, das Dosieraerosol vor erneuter Betätigung wieder 5x kräftig schütteln.
7. Falls ein Kortison haltiges Dosieraerosol verwendet wird, verhindert das nachträgliche Mundspülen, Trinken oder Zähneputzen Rückstände im Mund.
8. Bei täglicher Anwendung von Kortison haltigen Präparaten ist es hilfreich, dieses zur Erinnerung bei der Zahnbürste aufzubewahren.