

Behandlungspfad: Nachkontrolle Penis-Karzinom

NACHSORGESCHEMATA PENIS-KARZINOM

Follow up	1.+2. Jahr	3.-5- Jahr	Art der Untersuchung	Dauer
Initial pN0				
Nach Organerhaltung	Alle 3 Mte.	Alle 6 Mte.	Lokalstatus inkl. Leistenregion* (CT-Becken bei suspektem klinischem Status), Verlaufsbioptie nach topischer Therapie bzw. Laserablation eines pTis	Mind. 5 Jahre
Nach Penektomie	Alle 3 Mte.	Alle 12 Mte.	Lokalstatus inkl. Leistenregion* (CT-Becken bei suspektem klinischem Status)	Mind. 5 Jahre
Initial pN+				
	Alle 3 Mte.	Alle 6 Mte.	Lokalstatus inkl. Leistenregion* + CT- v. MR-Becken, ggf. US-gesteuerte FNAB v. FNAC	Mind. 5 Jahre
FNAB = Feinnadelaspirationsbiopsie FNAC = Feinnadelaspirationszytologie				
*Zudem sollten, sofern möglich, regelmässige Selbstuntersuchungen des Penis und der Leistenregion bds. durch den Patienten durchgeführt werden.				